

İNTRAHEPATİK SAFRAYOLLARI HASTALIKLARI

	Sekonder biliyer siroz	Primer biliyer siroz	Primer sklerozan kolantit
Etyoloji	Ekstrahepatik safra yolları obstrüksiyonları: • Biliyer atrezi • Safra taşları • Safra yolları darlıkları • Pankreas başı karsinomu	Otoimmunité olasılığı	Otoimmunité olasılığı %50-70 kolitle birlikte
Klinik bulgular	Cinsiyet ayrımı yok Kaşıntısız İkter Hepatosplenomegali Koyu idrar-akolik dışkı	Kadınlarda 6x Öteki bulgular Sekonder biliyer sirozdaki gibi Başlangıcı çok sessiz	Erkeklerde 2x Başlangıcı çok sessiz Öteki bulgular Sekonder biliyer sirozdaki gibi
Lab bulguları	Konjuge hiperbilirubinemi Serum düzeyleri yüksek: • Alkalın fosfataz • Safra asitleri • Kolesterol	Sekonder biliyer siroz gibi Ek olarak serum IgM otoantikorları (özellikle M2 tipi antimitokondrial antikor-AMA)	Sekonder biliyer siroz bulgularına ek olarak serum IgM düzeyi yüksek (hipergammaglobulinemi)
Patoloji	• Safra stazı (belirgin) • Safra yolları proliferasyonu • Safra yollarını kuşatan nötrofiller • Periportal alanlarda ödem	Safra yolları çevresinde granülömlar Bunu kuşatan yoğun lenfositler Safra yolları yıkımı	Safra duktusları çevresinde güçlü fibrozis Ekstrahepatik ve intrahepatik safra yollarında segmental stenoz bulguları
Sonuç	Siroz	Siroz	Siroz