

MİDE TÜMÖRLERİ

Tümör tipi	Bulgu
Benign tümörler Epitelyal tümörler (polipler) Mezenkimal tümörler (Lipoma Leiomyoma, Nörofibroma)	Glanduler epitel hücrelerinden oluşan saplı ya da geniş tabanlı oluşum Hiperplastik polip (%85) Fundus polipi (%10) Adenomatöz polip (%5) Mide çeperinde oluşurlar Sınırları düzenli mezenkimal kökenli tümörlerdir
Malign tümörler Karsinom	%90-95 Risk faktörleri: - Diet (nitrit, nitrozamin, tütsülenmiş besinler, aşırı tuz kullanımı, yetersiz meyve-sebze) - İntestinal metaplazi saptanan kronik gastrit (<i>H.pylori</i>, pernisiöz anemi) - Cerrahi (subtotal distal gastrektomi) Makroskopi: - Vejetan (ekzofitik): lümende tümsek oluşturan kitle - Ülserovejetan: lümende tümsek oluşturan kitlede ülserleşme bulguları - Diffuz: çepere infiltrate olan, lümende tümsek olamayan infiltrasyon (<i>linitis plastica</i>) Mikroskopi: - İntestinal tip: lümenlerinde müsin bulunan intestinal nitelikte halkalardan oluşan tümör - Diffuz: taşlı yüzük biçiminde (gastrik tip) epitel hücrelerinden oluşan infiltrasyon, bazı olgularda desmoplastik tepki Özgün bulgular: <i>Virchow nodülü</i>: Supraklaviküler lenf düğümü metastazı (ilk bulgulardan) <i>Krukenberg tümörü</i>: İnfiltran mide karsinomunun ovaryum metastazları <i>H.pylori</i> gastritlerinde T ve B lenfositlerinin aktivasyonu Lenf foliküllerinin oluşumu Lenfoma
Lenfoma, Karsinoid	Bkz Bağırsak tümörleri